



sonnig bis
halbschattig

BLÜTENZAUM Veitshöchheim



Schöne, niedrig wachsende Staudenkomposition für halbschattige Flächen und sonnige Gehölzränder.

Blütenaum Veitshöchheim (sonniger bis halbschattiger Gehölzrand)				Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	Anzahl/10m ²	Höhe cm	Farbe und Blütezeit												
Gerüstbildner															
Aster divaricatus, Waldaster	5	75	weiß, Aug.–Sept.												
Aster x frikartii 'Mönch', Frikarts Gartenaster	5	80	violettblau, Aug.–Sept.												
Gruppenstauden															
Anemone sylvestris, Waldanemone	6	25	weiß, Mai–Juni												
Buphthalmum salicifolium, Ochsenauge	6	45	gelb, Juni–Aug.												
Geranium renardii 'Philippe Vapelle', Storchschnabel	10	60	violett, Mai–Juni												
Hemerocallis x cultorum 'Stella de Oro', Taglilie	6	40	gelb, Juni–Sept.												
Heuchera micrantha 'Palace Purple', Purpurglöckchen	6	50	weiß, Juli–Aug.												
Luzula nivea, Schnee-Marbel	10	40	weiße Rispen, behaartes Blatt, Juni–Aug.												
Bodendecker															
Centaurea simplicicaulis 'Rosabella', Flockenblume	12	20	rosa, Mai–Juni												
Geranium sanguineum var. striatum, Storchschnabel	10	30	zartrosa, Juni–Aug.												
Viola sororia 'Freckles', Pfingstveilchen	10	15	weißlich, violett gefleckt, Mai–Juni												
Waldsteinia geoides, Golderdbeere	10	15	gelb, ohne Ausläufer, April–Juni												
Zwiebeln															
Anemone blanda 'White Splendour', Weißes Windröschen	36	10	weiß, März–April												
Crocus tommasinianus, Krokus	24	10	lavendellila, Feb.–März												
Eranthis hyemalis, Winterling	36	15	gelb, Feb.–März												
Narcissus 'Peeping Tom', Narzisse	24	30	tiefgelb, März												



Waldaster
Aster divaricatus



Frikarts Gartenaster
Aster x frikartii 'Mönch'



Waldanemone
Anemone sylvestris



Ochsenauge
Buphthalmum salicifolium



Storchschnabel
Geranium renardii 'Philippe Vapelle'



Taglilie
Hemerocallis x cultorum 'Stella de Oro'



Purpurglöckchen
Heuchera micrantha 'Palace Purple'



Schnee-Marbel
Luzula nivea



Flockenblume
Centaurea simplicicaulis 'Rosabella'



Storchschnabel
Geranium sanguineum var. striatum



Pfingstveilchen
Viola sororia 'Freckles'



Golderdbeere
Waldsteinia geoides



Weißes Windröschen
Anemone blanda 'White Splendour'



Krokus
Crocus tommasinianus



Winterling
Eranthis hyemalis



Narzisse
Narcissus 'Peeping Tom'

Bemerkungen
**
Schnitt

*, Schnitt

winter-/immergrün, Winterwirkung
*, winter-/immergrün, Winterwirkung
*
**
Selbstaussaat
**, winter-/immergrün, Winterwirkung
Tuffs 3–5 Stk.
Tuffs 5–10 Stk.
Tuffs 5–10 Stk., Selbstaussaat
Tuffs 5–10 Stk.

Charakter

Ansprechende Staudenmischung aus überwiegend niedrig wachsenden Arten, die vor allem im Zeitraum von Mai bis September für attraktive und wechselnde Aspekte sorgen. Die vorherrschenden Blütenfarben sind gelb, blau und weiß.

Verwendung (Sonniger bis halbschattiger Standort)

Hausgarten, öffentliche Anlagen. Sehr gut geeignet zur Pflanzung unter lichten Gehölzen und als Vorpflanzung von geschnittenen und freiwachsenden Hecken bei wechselnder Besonnung. Die Mischung erträgt keine extreme Trockenheit.

Spezielle Pflegehinweise

Rückschnitt Mitte Februar. Empfehlenswert sind 3 Jätgänge pro Jahr: Ende April/Anfang Mai, Ende Juni/Anfang Juli sowie Mitte Oktober.