

BLÜTENSCHLEIER Perennemix



Lockere, aber farbkraftig wirkende Staudenkomposition mit einigen grau-laubigen Arten. Sehr repräsentative Mischung, die sich auch für den Privatgarten empfiehlt.

Blütenschleier Perennemix (sonniger und trockener Standort)

	Anzahl/10m ²	Höhe cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Gerüstbildner															
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam', Reitgras	5	130	gelbbraun, Juli–Aug.												
Gruppenstauden															
Achillea clypeolata 'Moonshine', Schafgarbe	10	50	zitronengelb, Juni–Juli												
Aster novae-angliae 'Purple Dome', Raublattaster	10	60	violett, Sept.–Okt.												
Papaver orientale 'Marcus Perry', Mohn	10	70	rot, Mai–Juni												
Salvia nemorosa 'Mainacht', Salbei	10	50	dunkelviolettblau, Mai–Sept.												
Bodendecker															
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee', Perlkörbchen	6	20	weiß, Juli–Sept.												
Aster ericoides 'Snow Flurry', Kriech-Aster	10	15	weiß, Sept.–Okt.												
Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby', Zypressenwolfsmilch	6	25	gelb, Mai–Juni												
Gypsophila repens 'Rosenschleier', Schleierkraut	10	35	zartrosa gefüllt, Juni–Aug.												
Streupflanzen															
Linaria purpurea, Purpurleinkraut	6	60	violettpurpur, Juli–Aug.												
Zwiebeln															
Allium aflatunense 'Purple Sensation', Zierlauch	10	90	tiefpurpurviolett, Mai–Juni												
Anemone blanda 'Blue Shades', Blaues Windröschen	50	10	blau, März–April												
Crocus flavus ssp. flavus, Krokus	50	10	gelb, Feb.–März												
Eranthis hyemalis, Winterling	100	15	gelb, Feb.–März												
Muscari armeniacum 'Blue Pearl', Traubenhyazinthe	50	15	blau, März–April												
Tulipa praestans 'Füsilier', Wildtulpe	50	25	orangescharlach, April												



Reitgras

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'



Schafgarbe

Achillea clypeolata 'Moonshine'



Raublattaster

Aster novae-angliae 'Purple Dome'



Mohn

Papaver orientale 'Marcus Perry'



Salbei

Salvia nemorosa 'Mainacht'



Perlkörbchen

Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'



Kriech-Aster

Aster ericoides 'Snow Flurry'



Zypressenwolfsmilch

Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'



Schleierkraut

Gypsophila repens 'Rosenschleier'



Purpurleinkraut

Linaria purpurea



Zierlauch

Allium affratunense 'Purple Sensation'



Blaues Windröschen

Anemone blanda 'Blue Shades'



Krokus

Crocus flavus ssp. flavus



Winterling

Eranthis hyemalis



Traubenhyazinthe

Muscari armeniacum 'Blue Pearl'



Wildtulpe

Tulipa praestans 'Füsilier'

Bemerkungen
Schnitt, Winterwirkung
* , Schnitt, Bienenweide
* , Schnitt
Schnitt
***, Nachblüte nach Sommerrückschnitt
***, Schnitt
** , Bienenweide, Selbstsaat
** , ausläuferbildend

Selbstsaat
Schnitt, Tufts 3–5 Stk.
Tufts 5–10 Stk.
Tufts 5–10 Stk., verwildernd
Tufts 5–10 Stk., Selbstsaat
Tufts 5–10 Stk.
Tufts 5–10 Stk.

Charakter

Die gelben und blauen Blüten sorgen für einen frischen Frühjahrsaspekt. Die kontrastreichen orangeroten Farbtupfer werden im Sommer von hellgelb und violettblau abgelöst, umwoben vom zartrosa Blütenschleier der *Gypsophila*. Formstabile Spätblüher sorgen für einen ansprechenden Winteraspekt.

Verwendung (Sonniger Standort)

Für offene, freie Flächen, in sonniger und trockener Lage. Durchlässige, schottrige Substrate sind erforderlich.

Gut geeignet für Verkehrsinseln und Straßenbegleitgrün oder private Hausgärten.

Spezielle Pflegehinweise

Bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter, jäten nach Bedarf. Sollte nach mehreren Jahren ein zu dichter Gesamteindruck entstehen, kann ein Rückschnitt auf 15 cm wieder für Struktur sorgen. Wässern nur in der ersten Vegetationsperiode. Für diese Mischung eignet sich mineralischer Mulch, z. B. Kalksplitt 8/16.