



Staudenkomposition mit wechselnden Farben, dominierend sind jedoch gelb und blau. Durch verschieden hohe Stauden und Gräser ist auch das Winterbild sehr attraktiv.

Farbenspiel Veitshöchheim (sonniger und trockener Standort)

	Anzahl/10m ²	Höhe cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Gerüstbildner															
Achillea filipendulina 'Coronation Gold', Schafgarbe	1	70	goldgelb, Juni–Sept.												
Achillea filipendulina 'Walter Funcke', Schafgarbe	1	70	rot, Juni–Sept.												
Aster amellus 'Veilchenkönigin', Sommeraster	3	55	dunkelviolett, Aug.–Sept.												
Hemerocallis citrina, Taglilie	2	100	hellgelb, Juni–Aug.												
Panicum virgatum 'Rehbraun', Rutenhirse	1	80	Rotbraune Färbung, Blütenfarbe grünbraun, Juli–Sept.												
Gruppenstauden															
Coreopsis verticillata 'Zagreb', Mädchenaug	6	30	tiefgelb, Juni–Sept.												
Hemerocallis lilioasphodelus, Taglilie	3	75	hellgelb, Mai–Juni												
Knautia macedonica, Witwenblume	4	80	purpurrot, Juli–Aug.												
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk', Katzenminze	3	100	rosa, Juni–Sept.												
Origanum laevigatum 'Herrenhausen', Dost	3	50	purpurrosa, Aug.–Sept.												
Sedum telephium 'Matrona', Fetthenne	5	50	rosa Dolden, rötl. Blatt, Aug.–Okt.												
Bodendecker															
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee', Perlkörbchen	5	20	weiß, Juli–Sept.												
Calamintha nepeta 'Blue Cloud', Bergminze	11	40	hellblauviolett, Juli–Sept.												
Calamintha nepeta ssp. nepeta, Bergminze	11	35	weiß, Juli–Sept.												
Nepeta x faassenii, Katzenminze	12	30	violettblau, Juni–Sept.												
Salvia verticillata 'Purple Rain', Salbei	5	45	purpurviolett, Mai–Sept.												
Streupflanzen															
Catananche caerulea, Rasselblume	4	60	violettblau, Juli–Aug.												
Zwiebeln															
Crocus tommasinianus, Krokus	80	10	lavendellila, Feb.–März												
Crocus chrysanthus 'Goldlocks', Krokus	80	10	tiefgelb, Feb.–März												
Muscari armeniacum, Traubenhyazinthe	40	20	kobaltblau, April–Mai												
Tulipa praestans 'Füsilier', Wildtulpe	20	25	orangescharlach, April												



Schafgarbe
Achillea filipendulina
'Coronation Gold'



Schafgarbe
Achillea filipendulina
'Walter Funcke'



Sommeraster
Aster amellus 'Veilchenkönigin'



Taglilie
Hemerocallis citrina



Rutenhirse
Panicum virgatum 'Rehbraun'



Mädchenauge
Coreopsis verticillata 'Zagreb'



Taglilie
Hemerocallis lilioasphodelus



Witwenblume
Knautia macedonica



Katzenminze
Nepeta grandiflora
'Dawn to Dusk'



Dost
Origanum laevigatum
'Herrenhausen'



Fetthenne
Sedum telephium 'Matrona'



Perlkörbchen
Anaphalis triplinervis
'Sommerschnee'



Bergminze
Calamintha nepeta 'Blue Cloud'



Bergminze
Calamintha nepeta ssp. *nepeta*



Katzenminze
Nepeta x faassenii



Salbei
Salvia verticillata 'Purple Rain'



Rasselblume
Catananche caerulea



Krokus
Crocus tommasinianus



Krokus
Crocus chrysanthus 'Goldilocks'



Traubenhyazinthe
Muscari armeniacum



Wildtulpe
Tulipa praestans 'Fisilier'

Bemerkungen
*, Schnitt, Winterwirkung
Schnitt, Winterwirkung
***, Schnitt
*, duftend
Schnitt
***, Schnitt, sehr ausdauernd
*
***, Sommerschnitt Juni/Juli für Nachblüte, Selbstsaat
***, Sommerschnitt Juni/Juli für Nachblüte
*
Schnitt, Winterwirkung, Bienenpflanze
Selbstsaat
Tuffs 5–10 Stk.
Tuffs 5–10 Stk.
Tuffs 5–10 Stk.
mehrbliätige Tulpe

Charakter

Die Mischung fällt durch ihre wechselnden Farbaspekte und Höhenstaffelungen auf. Es dominieren Gelb- und Blautöne. Zahlreiche aromatisch duftende Arten entfalten ihre Wirkung in den Sommermonaten.

Verwendung (Sonniger Standort)

Intensive Staudenauswahl für vollsonnige Standorte in Vorgärten, für die Terrasse sowie für Flächen im ruhenden Verkehr. Gut geeignet für durchlässige Böden an trockenen Standorten.

Spezielle Pflegehinweise

Rückschnitt im Spätwinter. Sommerschnitt bei *Nepeta* und *Knautia macedonica* Ende Juni/Anfang Juli für eine Nachblüte empfehlenswert, 2 bis 4 Jätgänge pro Jahr.